

Instrucciones de

Sutab

Dosis fraccionada

Consulte esta hoja de instrucciones para la preparación de intestinos, **NO** consulte las instrucciones que vienen con el medicamento. Los resultados de esta prueba dependen de que su colon haya sido limpiado y vaciado cuidadosamente. Las heces (excremento) en el colon pueden ocultar enfermedades y tumores que podrían estar presentes. Por favor, siga estas instrucciones tan cuidadosamente como le sea posible; de lo contrario el examen podría ser inexacto o tendría que repetirse.

1 día antes de su procedimiento

12 AM(medianoche): Comience una dieta de líquidos claros esa mañana y sígala durante el día. *Aun cuando las instrucciones de la caja del kit de preparación indiquen que usted puede “desayunar ligero” ese día, **NO** consuma ninguna otra cosa a excepción de líquidos claros durante todo el día para asegurarse de realizar una limpieza eficaz. (Instrucciones de dieta listadas a continuación)*

- **BEBIDAS ADECUADAS PARA TOMAR:**

Jugo de manzana, jugo de uva blanco, limonada, Gatorade, agua, té (sin leche), café (sin crema), Kool-Aid, bebidas gaseosas claras, caldo de res claro, caldo de pollo claro, paletas, gelatina, y caramelos/dulces duros (Que no sean de color rojo o morado).

- **ALIMENTOS NO PERMITIDOS:**

Productos lácteos (leche regular, leche de la almendra, todo tipo de quesos, crema para café en polvo o líquida, yogur, queso requesón/cottage, mantequilla), productos lácteos “artificiales” (leche de soya y productos “sin lactosa”), cualquier alimento con tinte rojo o morado, alcohol (cualquier tipo), alimentos con pulpa (jugo de naranja)

6 PM: Comience la dosis 1 de su kit de preparación.

Paso 1: Beba el primer frasco de 12 tabletas dentro de un periodo de tiempo de 20 minutos. Llene de agua el envase que viene incluido para beber las tabletas. Beba todo el envase de agua.

Paso 2: Una hora después, beba tres envases más de agua de 16 onzas. Beba cada envase en un periodo de tiempo de 30 minutos. (30 minutos por cada envase) Utilice el envase vacío para hacer esto.

Asegúrese de tomar bastante líquido esto ayudará a prevenir la deshidratación y facilitará la limpieza del colon.

Día de su procedimiento

5 horas antes de su hora de llegada: Comience la dosis 2 de su kit de preparación.

Paso 1: Beba el segundo frasco de 12 tabletas dentro de un periodo de tiempo de 20 minutos. Llene de agua el envase incluido para beber las tabletas. Beba todo el envase de agua.

Paso 2: Una hora después, beba tres envases más de agua de 16 onzas. Beba cada envase en un periodo de tiempo de 30 minutos. (30 minutos por cada envase) Utilice el envase vacío para hacer esto.

3 horas antes de la hora de llegada: ABSOLUTAMENTE NADA DE COMER, BEBER, o MASTICAR hasta que su prueba haya finalizado. Consumir cualquier cosa después de que esa hora hará que se retrase su procedimiento o que posiblemente lo cancelen.

****Obtenga su voucher de descuento en <https://sutab.com/Savings> -- para pacientes con seguro médico comercial, el código del cupón se manda de forma electrónica a la farmacia con su receta médica**

Para programar una cita, o preguntas médicas o sobre la preparación llame al 239-343-6222

Para preguntas de cobros, llame al 239-343-5516